FICHA TÉCNICA

# Ambrocom

## EXPECTORANTES INYECTABLE

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-036

## Composición cualitativa y cuantitativa

**Cada ml contiene:**

| | |
|---|---|
| Ambroxol hcl | 4 mg |
| Vehículo c.b.p. | 1 ml |

## Forma farmacéutica

Solución inyectable

## Propiedades farmacológicas

El ambroxol, en su forma de clorhidrato, es un fármaco de la categoría de los medicamentos mucolíticos, es un metabolito de la bromhexina. Es útil en procesos bronquiales (con acción mucolítica) donde se requiere la expulsión de flemas para evitar el estancamiento del moco espeso en los alveólos pulmonares.

Mecanismo de acción
El ambroxol actúa sobre los neumocitos tipo II estimulando la síntesis y la secreción del surfactante pulmonar. Además interviene coadyuvando en la producción y el transporte de la secreción bronquial. Esto permite disminuir la secreción bronquial y favorecer la permeabilidad de la luz alveolar y bronquial.

Farmacocinética: El fármaco se absorbe rápidamente por vía oral a nivel del intestino. Tiene una vida media de 10 horas aproximadamente. Se une de manera reversible a las proteínas plasmáticas y un 10% de la sustancia activa es desechada por las heces fecales y renales.




## Especies

Bovinos (carne y leche), porcinos, caprinos (carne) y caninos.

## Indicaciones

Indicado para el tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio como son: neumonías, bronconeumonías, sinusitis, laringitis, traqueítis y bronquitis

**HECHO EN MÉXICO POR:**
Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.

Comadsa

# Ambrocom

## EXPECTORANTES INYECTABLE

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-036

## Efectos adversos

Los más comunes son de carácter gastrointestinal, que desaparecen cuando se deja el medicamento..

## Dosis y vía de administración

**Bovinos (carne y leche), porcinos, caprinos (carne) y caninos:** 3 mg/kg de peso vivo cada 24 horas durante 5 días.

**Vía de administración:** intramuscular profunda.

## Advertencias

No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa.

## Tiempo de retiro

No usar este producto 4 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano.

No utilizar para consumo la leche procedente de animales tratados con este producto, hasta 3 días después de la última aplicación.

## Conservación

Almacenar en un lugar fresco y seco al resguardo de la luz solar.

## Presentación

Frasco con 20 ml
Frasco con 100 ml
Frasco con 250 ml




**USO VETERINARIO**
**CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO**
**SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**

**HECHO EN MÉXICO POR:**
Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.

Comadsa